


お薬のごあんない


LASEK ※術後1週間まで

点眼薬 / 効能	使用方法
 ①オフロキシ点眼液 5ml 【効能】細菌を抑える作用	5回/日(3~4時間毎) (両・右・左)眼に点眼 ※点眼は1滴ずつで十分です。 ※①→②の順で、間を5分程度あけて点眼してください。 ※③は①②の各回の間に点眼してください。
 ②DEX0.1点眼液 5ml 【効能】炎症を抑える作用	
 ③ヒアロンサン点眼液 5ml 【効能】乾燥を防ぐ作用	



内服薬 / 効能	使用方法
 ①オラセフ 【効能】細菌を抑える作用	3回/日(朝・昼・夕食後) 1錠/回5日分
 ②プレドニゾロン 【効能】炎症を抑える作用	
 ③プロテカジン 10mg 【効能】胃のお薬	2回/日(朝・夕) 1錠/回5日分
 ④ケンタン 【効能】痛み止め(9錠)	痛みの強いとき1錠/回(間隔4時間以上あける) 1日3回まで服用可



【痛み止め】

点眼薬 / 効能	使用方法
 ベノキシル点眼液 【効能】痛みを抑える作用	●痛みがどうしても我慢出来ない時に1滴ずつ ※頻回に使用することにより角膜上皮障害(黒目がただれてしまう)を起こすことがあります。 ※点眼の効果は20~30分程度でなくなります。 点眼から次回の点眼まで最低でも1時間空けて下さい。

※術後1週間以降

点眼薬 / 効能	使用方法
 ①フルオロメトロン点眼液 0.1% 【効能】炎症を抑える作用(ステロイド) ※よく振ってから点眼	5回/日(3~4時間毎) (両・右・左)眼に点眼 ※点眼は1滴ずつで十分です。 ※①→②の順で、間を5分程度あけて点眼してください。
 ②アレニスト点眼液 0.5% 【効能】炎症を抑える作用(非ステロイド)	

